



A 11. hét elején a hideg miatt átmenetileg visszaesett a pollenterhelés, a hét közepétől azonban a felmelegedés hatására ugrásszerűen megemelkedett.

□

A mogyoró virágzása lassan lecsengőben van, az égeré most tetőzik, megkezdte csúcsidőszakát a ciprus- és tiszafafélék pollenszórása, és felfutóban van a nyáré, a kőrisé, a szilé és a fűzé.

Országos viszonylatban még mindig az éger (*Alnus*) pollenszemei vannak jelen legnagyobb mennyiségben a levegőben, de már nem minden állomáson. Koncentrációja erősen emelkedett - csak Békéscsabán nem haladta meg a közepes szintet, a legtöbb helyen nagyon magas, 6 városban magas szintet mértek. Békéscsabán, Győrött és Pécsen a ciprus- és tiszafafélék (*Cupressaceae/Taxaceae*) virágpora volt jelen a legnagyobb mennyiségben, virágzásuk hirtelen indult be, összpollenszámuk több, mint 100-szorosára emelkedett - Győrött, Békéscsabán, Egerben és Pécsen nagyon magas, a legtöbb városban magas, Szolnokon és Salgótarjánban közepes szintet ért el. Bár koncentrációja az előző hetihez képest emelkedett, a mogyoró (*Corylus*) pollenszórása már lecsengőben van - a közepes szintet csak Miskolcon haladta meg, egy napra. Beindult a nyár (*Populus*) virágzása - országszerte közepes, Tatabányán még alacsony koncentrációban monitorozták. Emelkedett a kőris (*Fraxinus*) virágporának mennyisége - Békéscsabán, Pécsen és Zalaegerszegen elérte a közepes szintet, a többi városban alacsony szintet regisztráltak.

Elindult a szil (*Ulmus*), a fűz (*Salix*) és a juhar (*Acer*) virágzása is, bár pollenkoncentrációjuk még csak egy-egy napra és 1, esetleg 2 állomáson érte el a közepes szintet.

A kültéri allergén gombaelemek mennyisége országszerte alacsony.

Dr. Lehel Ferenc

kistérségi tisztifőorvos